



**DIPEMINA®**  
**FRACCIONES FLAVONOIDES**  
**PURIFICADAS**

Comprimidos recubiertos  
Venta bajo receta  
Industria Argentina

**FÓRMULA CUALI-CUANTITATIVA:**

Cada comprimido recubierto contiene: Fracción flavonoide purificado y micronizado (Diosmina 450 mg; Hesperidina 50 mg) 500 mg; Excip. c.s.p. 1 comp. rec.

**FARMACOLOGÍA:**

Venotónico y vasculoprotector. *En farmacología:* Ejerce una acción en el sistema vascular de retorno: a nivel de las venas, disminuye la distensibilidad venosa y reduce la estasis venosa. A nivel de microcirculación, normaliza la permeabilidad capilar y refuerza la resistencia capilar. A nivel linfático, mejora el drenaje linfático y disminuye la sobrecarga linfática.

*En farmacología clínica:* estudios controlados a doble ciego utilizando métodos que permitieron objetivar y cuantificar la actividad sobre la hemodinamia venosa y la microcirculación, confirmaron en el hombre las propiedades farmacológicas de las fracciones flavonoides purificadas. Relación dosis-efecto: La existencia de la relación dosis-efecto estadísticamente significativa se estableció sobre los parámetros pletismográficos venosos: capacidad de distensión y tiempo de vaciamiento. La mejor relación de dosis-efecto se obtiene con 2 comprimidos. Actividad venotónica: aumenta el tono venoso: la pletismografía de oclusión venosa con manguito de mercurio permitió evidenciar una disminución de los tiempos de vaciamiento venoso. Actividad microcirculatoria: estudios controlados a doble ciego demostraron una diferencia estadísticamente significativa entre este medicamento y el placebo. En los enfermos que presentaban signos de fragilidad capilar, aumenta la resistencia capilar medida por angioestereometría. Actividad linfática: en pacientes con edema linfático post-mastectomía, se confirmó la disminución del edema, y esta mejoría clínica fue confirmada con pruebas complementarias como linfografía isotópica, de la que todos los parámetros (T<sub>12</sub>, aclaramiento, velocidad circulatoria linfática) mejoran.

**FARMACOCINÉTICA:**

En el hombre, tras la administración por vía oral del medicamento con diosmina marcada con C14, la eliminación es básicamente fecal, y la eliminación urinaria, es de un 14% de la cantidad administrada.

La semivida de eliminación es de 11 horas. El producto es altamente metabolizado lo que se evidencia por la presencia de diversos ácidos fenólicos en la orina.

**INDICACIONES:**

Tratamiento de las manifestaciones de la insuficiencia venosa crónica de los miembros inferiores, funcional y orgánica: sensación de pesadez, dolor, calambres nocturnos. Tratamiento de los signos funcionales ligados a la patología hemorroidal.

**POSOLOGÍA:**

Insuficiencia venosa crónica: 2 comprimidos día, uno con el desayuno y otro con la cena junto con las comidas.  
Crisis hemorroidales: es de 6 comprimidos diarios los primeros cuatro días y luego 4 comprimidos diarios los 3 días siguientes.

**CONTRAINDICACIONES:**

Hipersensibilidad al principio activo o excipientes.

**EFFECTOS ADVERSOS:**

Fueron descriptos algunos casos de náuseas, vómitos, diarrea y dispepsia leve y de desórdenes digestivos banales y de desórdenes neurovegetativos fueron descriptos, no obligando nunca a la interrupción del tratamiento.

**PRECAUCIONES:**

En las crisis hemorroidales, la administración de Dipemina, no exime del tratamiento específico de otras enfermedades anales. El tratamiento debe ser de corta duración y si los síntomas no ceden rápidamente debe consultar a su médico.

Embarazo: los estudios experimentales en animales no han mostrado efectos teratogénicos. Además, en la especie humana no se ha descripto ningún efecto nocivo hasta el momento.

Lactancia: debido a la ausencia de conocimientos sobre el paso a la leche materna, durante el período de tratamiento, la lactancia está desaconsejada.

**SOBREDOSIFICACIÓN:**

No se han descripto casos de sobredosificación. El amplio margen terapéutico de esta especialidad determina que el riesgo de intoxicación sea prácticamente nulo.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con el C.I.A.T. Tel. 1722.

**CONSERVACIÓN:**

Conservar a temperatura ambiente, entre 15°C - 30°C.

**PRESENTACIONES:**

Envases conteniendo 30 y 60 comprimidos recubiertos.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

Especialidad Medicinal autorizada por el  
Ministerio de Salud. Certificado N° 50.942



LAZAR

**Dr. LAZAR y Cía. S.A.Q. e I.**  
Av. Vélez Sársfield 5853/5855  
B1605EPI Munro, Pcia. de Buenos Aires  
Directora Técnica: Daniela A. Casas,  
Farmacéutica y Bioquímica.



00000  
P000

