

ALPRAZOLAM LAZAR®

Comprimidos



Fórmula:

Cada comprimido contiene: Alprazolam..... 1 mg
Excipientes c.s.p. 1 comprimido.

Propiedades:

El Alprazolam, al igual que otras benzodiazepinas, es un potenciador de las acciones del ácido gammaaminobutírico (GABA).

Los 2 metabolitos principales son el α hidroxialprazolam (cuya actividad es la mitad de la del Alprazolam) y la benzofenona esencialmente inactiva. Los niveles plasmáticos de estos metabolitos son extremadamente bajos y es imposible describir en forma precisa su farmacocinética. Sin embargo, su vida media es del mismo orden que la de Alprazolam. La vida media de Alprazolam es intermedia, de alrededor de 12 a 15 horas. Tiene una biodisponibilidad de 80%; la absorción es rápida con: efecto clínico máximo 1 a 1.5 horas después de una dosis oral; el pico plasmático alcanza a 17.3 ng/ml vía sublingual y 14.4 ng/ml vía oral. La vida media en adulto mayor es de 19 horas. Se une en un 80% a proteínas séricas. Es eliminado por biotransformación y sus metabolitos son excretados principalmente por vía renal (80%).

Posología:

La posología debe ser adaptada según el caso y reducida si aparecen efectos secundarios. La dosis máxima diaria es de 4 mg al día. Siempre se debe usar la dosis efectiva más baja posible y en sujetos de edad avanzada en promedio se debe usar la mitad de la posología.

Efectos Colaterales:

Según la dosis, el momento de la toma y la sensibilidad del paciente: somnolencia (particularmente en las personas de edad), hipotonía muscular, distonías, fatiga, sedación, debilidad musculoesquelética, anorexia, amnesia pasajera, dificultad de concentración, amnesia anterógrada, cambios en la libido, irregularidades menstruales, incontinencia, retención urinaria, diplopía y disartria. En ciertos sujetos se han podido observar reacciones paradojales: irritabilidad, sobreexcitación y síndrome confusional. También se han observado reacciones de hipersensibilidad cutánea del tipo máculopapular pruriginosas. Si estas reacciones ocurren, se aconseja suspender el tratamiento.

La suspensión del tratamiento debe ser progresiva, una suspensión brusca podría ocasionar síntomas de abstinencia que se producirán 2 a 3 días después de la suspensión del tratamiento dados por irritabilidad, ansiedad, dolores musculares, temblores, insomnio, pesadillas, náuseas y vómitos. Excepcionalmente un síndrome mayor, a veces retardado puede sobrevenir con convulsiones aisladas, estados de mal mioclónico con síndrome confusional que es generalmente precedido de síndromes menores.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad reconocida a las benzodiazepinas. Insuficiencia respiratoria severa.

Glaucoma agudo de ángulo estrecho.

Advertencias:

No debe utilizarse como terapia de reemplazo en tratamientos de pacientes psicóticos. Un síndrome de privación puede sobrevenir al suspender bruscamente un tratamiento prolongado, sobre todo a dosis elevadas (ver efectos colaterales).

Precauciones:

Miastenia: la ingesta de Alprazolam Lazar debe estar bajo vigilancia debido a la posible acentuación de fatiga muscular. En insuficiencia respiratoria moderada, se recomienda adaptar la posología. La ingestión de bebidas alcohólicas es formalmente desaconsejada durante el tratamiento. La atención o alerta mental pueden estar disminuidas. Esto es muy importante en los conductores de vehículos y la utilización de máquinas, debido al riesgo de somnolencia diurna atribuida al empleo de este medicamento. En caso de insuficiencia renal y/o hepática puede ser necesario adaptar la dosis.

Embarazo: Si bien los efectos teratogénicos no se han confirmado, si se sabe que las benzodiazepinas son potencialmente riesgosas en la especie humana pudiendo causar daño fetal. Además no es recomendable utilizar estas sustancias durante el parto por la posibilidad de que sobrevengan hipotonía, hipotermia y problemas respiratorios en el recién nacido.

Lactancia: el empleo de este medicamento no es aconsejable durante el período de lactancia.

Interacciones Medicamentosas:

Sinergismo aditivo: con depresores neuromusculares (curarizantes, miorrelajantes). Con otros medicamentos depresores centrales (en particular los neurolépticos). La administración simultánea con benzodiazepinas puede potenciar la sedación. El riesgo de aparición de síndrome de privación aumenta con la asociación de psicotrópicos, anticonvulsivantes, antihistamínicos y alcohol. La cimetidina disminuye el clearance de Alprazolam. Los anticonceptivos orales pueden aumentar la respuesta al Alprazolam.

Sobredosificación:

Somnolencia muy profunda con coma según la cantidad ingerida. Tratamiento sintomático en un medio especializado.

Ante la eventualidad de una sobredosis, concurrir al Hospital más cercano, o comunicarse con el CIAT al Tel.: 1722.

Presentación:

Alprazolam Lazar 1 mg: Envases conteniendo 20 y 60 comprimidos.

MEDICAMENTO CONTROLADO



LAZAR S.A.
Blvr. Artigas 1158
Tel.: 2708 8494
MONTEVIDEO

28092010